



各 位

2011年11月28日
キョーリン製薬ホールディングス株式会社
東京都千代田区神田駿河台2-5

2011年11月 新製品の発売のお知らせ

キョーリン製薬ホールディングス株式会社（本社 東京都千代田区、代表取締役社長 山下正弘）の子会社であるキョーリン リメディオ株式会社（本社 石川県金沢市、代表取締役社長 荻原茂）は2011年11月追補収載品5成分8品目をこの度、新発売いたします。

今後もキョーリン リメディオ（株）は、信頼感のあるジェネリック医薬品を発売することにより健康貢献という企業理念の具現化を目指します。

記

追補収載品

品 名	包 装
ドネペジル塩酸塩錠 3mg 「杏林」	PTP14錠、PTP28錠、PTP140錠
ドネペジル塩酸塩錠 5mg 「杏林」	PTP56錠、PTP140錠、バラ100錠
ドネペジル塩酸塩OD錠 3mg 「杏林」	PTP14錠、PTP28錠、PTP140錠
ドネペジル塩酸塩OD錠 5mg 「杏林」	PTP56錠、PTP140錠
ロラタジンOD錠 10mg 「杏林」	PTP100錠
レボフロキサシン点眼液0.5% 「杏林」	5mL×5本、5mL×10本、5mL×50本
アレゲイン錠10	PTP100錠、PTP500錠
ガスドック静注10mg	10mL×10管

以上

この件に関するお問い合わせ先
コーポレートコミュニケーション統轄部
TEL：03-3293-3414
FAX：03-3293-3454

<製品概要>

1. 製品名 和名：ドネペジル塩酸塩錠 3mg・5mg 「杏林」
洋名：DONEPEZIL HYDROCHLORIDE Tablets 3mg・5mg “KYORIN”
2. 一般名 ドネペジル塩酸塩
3. 効能・効果 軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制
4. 用法・用量 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。
5. 薬価 3mg 1錠：190.8円
5mg 1錠：284.8円
6. 包装 3mg：PTP包装 14錠、28錠、140錠
5mg：PTP包装 56錠、140錠
バラ包装 100錠
7. JANコード ドネペジル塩酸塩錠3mg 「杏林」
PTP14錠：4987060304308
PTP28錠：4987060304315
PTP140錠：4987060304322
ドネペジル塩酸塩錠5mg 「杏林」
PTP56錠：4987060304339
PTP140錠：4987060304346
バラ100錠：4987060304353
8. 薬価収載日 2011年11月28日
9. 発売日 2011年11月28日

<製品概要>

1. 製品名 和名：ドネペジル塩酸塩OD錠3mg・5mg「杏林」
洋名：DONEPEZIL HYDROCHLORIDE OD Tablets 3mg・5mg “KYORIN”
2. 一般名 ドネペジル塩酸塩
3. 効能・効果 軽度及び中等度のアルツハイマー型認知症における認知症症状の進行抑制
4. 用法・用量 通常、成人にはドネペジル塩酸塩として1日1回3mgから開始し、1～2週間後に5mgに増量し、経口投与する。
5. 薬価 3mg1錠：190.8円
5mg1錠：284.8円
6. 包装 3mg：PTP包装 14錠、28錠、140錠
5mg：PTP包装 56錠、140錠
7. JANコード ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「杏林」
PTP14錠：4987060304360
PTP28錠：4987060304377
PTP140錠：4987060304384
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「杏林」
PTP56錠：4987060304391
PTP140錠：4987060304407
8. 薬価収載日 2011年11月28日
9. 発売日 2011年11月28日

<製品概要>

1. 製品名 和名：ロラタジンOD錠10mg「杏林」
洋名：LORATADINE OD Tablets 10mg“KYORIN”
2. 一般名 ロラタジン
3. 効能・効果 アレルギー性鼻炎、蕁麻疹、皮膚疾患（湿疹・皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うそう痒
4. 用法・用量 成人：通常、ロラタジンとして1回10mgを1日1回、食後に経口投与する。
なお、年齢・症状により適宜増減する。
5. 薬価 10mg1錠：81.3円
6. 包装 10mg：PTP包装 100錠
7. JANコード PTP100錠：4987060304414
8. 薬価収載日 2011年11月28日
9. 発売日 2011年11月28日

<製品概要>

1. 製品名 和名：レボフロキサシン点眼液0.5%「杏林」
洋名：LEVOFLOXACIN Ophthalmic solution 0.5% “KYORIN”
2. 一般名 レボフロキサシン水和物
3. 効能・効果 <適応菌種>
本剤に感性のブドウ球菌属、レンサ球菌属、肺炎球菌、腸球菌属、マイクロコッカス属、モラクセラ属、コリネバクテリウム属、クレブシエラ属、エンテロバクター属、セラチア属、プロテウス属、モルガネラ・モルガニー、インフルエンザ菌、ヘモフィルス・エジプチウス（コッホ・ウィークス菌）、シュードモナス属、緑膿菌、ステノトロホモナス（ザントモナス）・マルトフィリア、アシネトバクター属、アクネ菌
<適応症>
眼瞼炎、涙嚢炎、麦粒腫、結膜炎、瞼板腺炎、角膜炎（角膜潰瘍を含む）、眼科周術期の無菌化療法
4. 用法・用量 通常、1回1滴、1日3回点眼する。なお、症状により適宜増減する。
5. 薬価 0.5%1mL：92.0円
6. 包装 5mL×5本、5mL×10本、5mL×50本
7. JANコード 5mL×5本：4987060304445
5mL×10本：4987060304452
5mL×50本：4987060304469
8. 薬価収載日 2011年11月28日
9. 発売日 2011年11月28日

<製品概要>

1. 製品名 和名：アレゲイン錠10
洋名：ALEGAIN Tablets 10
2. 一般名 エピナスチン塩酸塩
3. 効能・効果 気管支喘息
アレルギー性鼻炎
蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症、痒疹、瘙癢を伴う尋常性乾癬
4. 用法・用量 1. 気管支喘息、蕁麻疹、湿疹・皮膚炎、皮膚掻痒症、痒疹、瘙癢を伴う尋常性乾癬：
通常、成人にはエピナスチン塩酸塩として1回20mgを1日1回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
2. アレルギー性鼻炎：
通常、成人にはエピナスチン塩酸塩として1回10～20mgを1日1回経口投与する。
なお、年齢、症状により適宜増減する。
5. 薬価 10mg1錠：28.1円
6. 包装 PTP100錠、PTP500錠
7. JANコード PTP100錠：4987060304421
PTP500錠：4987060304438
8. 薬価収載日 2011年11月28日
9. 発売日 2011年11月28日

<製品概要>

1. 製品名 和名：ガスドック静注10mg
洋名：GASDOCK Intravenous Solution 10mg
2. 一般名 ファモチジン
3. 効能・効果 ○上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)、Zollinger-Ellison症候群、侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制
○麻酔前投薬
4. 用法・用量 ○上部消化管出血(消化性潰瘍、急性ストレス潰瘍、出血性胃炎による)、Zollinger-Ellison症候群、侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制
通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを1日2回(12時間毎)緩徐に静脈内投与する。又は輸液に混合して点滴静注する。なお、年齢・症状により適宜増減する。上部消化管出血及びZollinger-Ellison症候群では、一般的に1週間以内に効果の発現をみるが、内服可能となった後は経口投与に切りかえる。侵襲ストレス(手術後に集中管理を必要とする大手術、集中治療を必要とする脳血管障害・頭部外傷・多臓器不全・広範囲熱傷)による上部消化管出血の抑制では、術後集中管理又は集中治療を必要とする期間(手術侵襲ストレスは3日間程度、その他の侵襲ストレスは7日間程度)の投与とする。
○麻酔前投薬
通常、成人にはファモチジンとして1回20mgを麻酔導入1時間前に緩徐に静脈内投与する。
5. 薬価 10mg 10mL 1管：104.0円
6. 包装 10mL×10管
7. JANコード 10mL×10管：4987060304476
8. 薬価収載日 2011年11月28日
9. 発売日 2011年11月28日