

添付文書改訂のお知らせ

90-2
平成2年11月

アプレース[®]錠100mg アプレース[®]細粒

製造元 杏林製薬株式会社
販売元 杏林薬品株式会社

このたび弊社製品、アプレース錠100mg・同細粒につきまして、市販後使用成績の調査に基づき、「使用上の注意」の「副作用」の項目を一部改訂いたしますので、ご案内申し上げます。

(……部：発現頻度を表す副詞*の変更、——部：語句の追加)

新	旧
<p>(1)副作用 1) 消化器 ときに便秘、まれに腹部膨満感、胸やけ、嘔気等があらわれることがある。</p> <p>2) 肝臓 ときにGOT、GPT上昇、まれにALP、γ-GTP上昇等の肝機能の異常があらわれることがある。</p> <p>3) 過敏症 まれに痒痒、発疹等があらわれることがある。</p> <p>4) その他 まれに頭重感、全身倦怠感、動悸等があらわれることがある。</p>	<p>(1)副作用 1) 消化器 ときに便秘、腹部膨満感、胸やけ、嘔気等があらわれることがある。</p> <p>2) 肝臓 ときにS-GOT、S-GPT、ALP、γ-GTP上昇等の肝機能の異常があらわれることがある。</p> <p>3) 過敏症 ときに痒痒感、まれに発疹等があらわれることがある。</p> <p>4) その他 ときに頭重感、全身倦怠感、動悸等があらわれることがある。</p>

使用上の注意

* 副作用の発現頻度は「まれに」(0.1%未満)、「ときに」(0.1%~5%未満)、副詞なし(5%以上又は頻度不明)の3分類で表現されます。