

添付文書改訂のお知らせ

91-2
平成3年5月

バクシダール錠100mg バクシダール錠200mg

製造元 杏林製薬株式会社
販売元 杏林薬品株式会社

謹啓 平素は格別の御引立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社のバクシダール錠100mg・200mgについて、厚生省薬務局安全課長通知(薬安指示第63号、平成3年5月22日付)に基づき、「使用上の注意」を改訂致しますので、ご案内申し上げます。 敬白

	新	旧
使 用 上 の 注 意	(2) 次の患者には慎重に投与すること 1) 高度の腎障害のある患者 2) てんかん等の痙攣性疾患又はこれらの既往歴のある患者(痙攣を起こすことがある。)	(2) 次の患者には慎重に投与すること 高度の腎障害のある患者
	(3) 副作用 1) ショック 2) 過敏症 3) 皮膚 まれに皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)があらわれることがあるので、このような症状があらわれた場合には、投与を中止し適切な処置を行うこと。 4) 腎臓 5) 肝臓 6) 消化器 7) 血液 8) 精神神経系 ときにめまい、また、まれに痙攣、頭痛、不眠、しびれ感があらわれることがある。 9) その他 まれに全身倦怠感、冷感、熱感、浮腫、心悸亢進、胸痛があらわれることがある。	(3) 副作用 1) ショック 2) 過敏症 3) 腎臓 4) 肝臓 5) 消化器 6) 血液 7) その他 ときにめまい、また、まれに頭痛、不眠、全身倦怠感、しびれ感、冷感、熱感、浮腫、心悸亢進、胸痛があらわれることがある。

下線部が追加改訂箇所です。