

## 使用上の注意改訂のお知らせ

96-3

平成8年3月

強心・利尿剤  
日本薬局方 **アミノフィリン** 注射液  
**キョーフィリン<sup>®</sup> 2.5%**  
(アミノフィリン)



杏林製薬株式会社  
東京都千代田区神田駿河台2-5

謹啓 平素は格別の御引立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社の **キョーフィリン<sup>®</sup> 2.5%** について、「使用上の注意」を改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

なお、改訂添付文書を封入した製品が、お手元に届くまでには若干時間のずれが生ずることがあると存じますが、何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。 敬白

### 1. 改訂内容

改訂後	改訂前
<p>4. 相互作用 併用に注意すること (2)テオフィリンの血中濃度を上昇させる薬剤 エリスロマイシン、クラリスロマイシン、 リン酸オレアンドマイシン、ロキシスロマ イシン、エノキサシン、シプロフロキサシ ン、トスフロキサシン、ノルフロキサシン、 ピペミド酸三水和物、チアベンダゾール、 シメチジン、塩酸チクロピジン、塩酸メキ シレチン、塩酸アミオダロン、塩酸ベラパ ミル、<u>塩酸ジルチアゼム</u>、インターフェロ ン、シクロスポリン、アロプリノール、イ ブプリフラボン</p> <p>5. 副作用（まれに：0.1%未満、ときに：0.1% ～5%未満、副詞なし：5%以上又は頻度 不明） (1)重大な副作用 1)国内での副作用 <u>③横紋筋融解症：まれに横紋筋融解症があら われることがあるので、CPK上昇等に注 意すること。</u></p>	<p>4. 相互作用 併用に注意すること (2)テオフィリンの血中濃度を上昇させる薬剤 エリスロマイシン、クラリスロマイシン、 リン酸オレアンドマイシン、ロキシスロマ イシン、エノキサシン、シプロフロキサシ ン、トスフロキサシン、ノルフロキサシン、 ピペミド酸三水和物、チアベンダゾール、 シメチジン、塩酸チクロピジン、塩酸メキ シレチン、塩酸アミオダロン、塩酸ベラパ ミル、インターフェロン、シクロスポリン、 アロプリノール、イブプリフラボン</p> <p>5. 副作用（まれに：0.1%未満、ときに：0.1% ～5%未満、副詞なし：5%以上又は頻度 不明） (1)重大な副作用 1)国内での副作用</p>

—：平成8年1月25日付事務連絡による改訂箇所



