

Question

成人の用法・用量は？



Answer

本剤（フルティフォーム[®]）の成人における用法及び用量は以下のとおりです。

成人

通常、成人には、フルティフォーム[®]50 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 50 μ g 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5 μ g）を 1 回 2 吸入、1 日 2 回投与する。なお、症状に応じてフルティフォーム[®]125 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 125 μ g 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5 μ g）を 1 回 2～4 吸入、1 日 2 回投与する。

添付文書の記載は、以下のとおりです。

6. 用法及び用量

成人

通常、成人には、フルティフォーム 50 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 50 μ g 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5 μ g）を 1 回 2 吸入、1 日 2 回投与する。なお、症状に応じてフルティフォーム 125 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 125 μ g 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5 μ g）を 1 回 2～4 吸入、1 日 2 回投与する。

7. 用法及び用量に関連する注意

症状の緩解がみられた場合は、治療上必要最小限の用量を投与し、必要に応じ吸入ステロイド剤への切り替えも考慮すること。

また、成人患者では、喘息症状に応じて本剤の最適な用量を選択する必要がありますので、投与期間中は定期的に受診するように指導してください。

添付文書の用法及び用量に関する重要な基本的注意の記載は、以下のとおりです。

8. 重要な基本的注意

8.10 本剤は患者の喘息症状に応じて最適な用量を選択するため、本剤の投与期間中は患者を定期的に診察すること。

・添付文書（6 項、7 項、8.10 項） [2021 年 11 月改訂（第 4 版）]