

Question

小児の用法・用量は？



Answer

本剤（フルティフォーム[®]）の小児における用法及び用量は以下のとおりです。

小児

通常、小児には、フルティフォーム[®]50 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして50 μ g 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として5 μ g）を1回2吸入、1日2回投与する。

このため、小児では吸入器本体のラベルの文字色とアルミ缶ラベルの帯色が「水色」であるフルティフォーム[®]50 エアゾールのみを使用してください。吸入器本体のラベルの文字色とアルミ缶ラベルの帯色が「ピンク色」であるフルティフォーム[®]125 エアゾールは使用できません。また、用法及び用量の変更もできません。

添付文書の小児への投与に関する記載は、以下のとおりです。

6. 用法及び用量

小児

通常、小児には、フルティフォーム 50 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして50 μ g 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として5 μ g）を1回2吸入、1日2回投与する。

7. 用法及び用量に関連する注意

症状の緩解がみられた場合は、治療上必要最小限の用量を投与し、必要に応じ吸入ステロイド剤への切り替えも考慮すること。

9. 特定の背景を有する患者に関する注意

9.7 小児等

9.7.2 低出生体重児、新生児、乳児又は5歳未満の幼児を対象とした臨床試験は実施していない。

・添付文書（6項、7項、9.7.2項） [2021年11月改訂（第4版）]

・インタビューフォーム（IV.1.(1)剤形の区別） [2021年11月改訂（第10版）]