

Question

吸入を忘れた場合は？



Answer

本剤（フルティフォーム[®]）の吸入忘れに気付いた場合は、すぐに1回分を吸入させていただきます。

ただし、次に吸入する時間が近い場合は、1回とばして、次の時間に1回分を吸入させていただきます。

絶対に2回分を一度に吸入しないように指導してください。

誤って多く吸入した場合は、医師又は薬剤師に相談するように説明してください。

添付文書の用法及び用量に関する記載は、以下のとおりです。

6. 用法及び用量

成人

通常、成人には、フルティフォーム 50 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 50 μ g 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5 μ g）を1回2吸入、1日2回投与する。なお、症状に応じてフルティフォーム 125 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 125 μ g 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5 μ g）を1回2～4吸入、1日2回投与する。

小児

通常、小児には、フルティフォーム 50 エアゾール（フルチカゾンプロピオン酸エステルとして 50 μ g 及びホルモテロールフマル酸塩水和物として 5 μ g）を1回2吸入、1日2回投与する。

7. 用法及び用量に関連する注意

症状の緩解がみられた場合は、治療上必要最小限の用量を投与し、必要に応じ吸入ステロイド剤への切り替えも考慮すること。

- ・添付文書（6項、7項） [2021年11月改訂（第4版）]
- ・くすりのしおり[®] [2020年6月改訂]