

## Question

アルコールに過敏な患者への投与は？



## Answer

本剤（フルティフォーム<sup>®</sup>）には、「無水エタノール」が微量含まれていますので、アルコール綿で皮膚を拭いた時に赤くなるなど、アルコールに過敏な場合には申し出るように指導してください。

ただし、アルコール過敏症と診断されている場合には、禁忌となりますので投与しないでください。

添付文書の禁忌に関する記載は、以下のとおりです。

### 2. 禁忌（次の患者には投与しないこと）

- 2.1 有効な抗菌剤の存在しない感染症、深在性真菌症の患者 [ステロイドの作用により症状を増悪させるおそれがある。]
- 2.2 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
- 2.3 デスモプレシン酢酸塩水和物（男性における夜間多尿による夜間頻尿）を投与中の患者 [10.1 参照]

本剤の成分は以下となります。

- ・有効成分：フルチカゾンプロピオン酸エステル、ホルモテロールフマル酸塩水和物
- ・添加剤：クロモグリク酸ナトリウム、無水エタノール、1,1,1,2,3,3,3-ヘptaフルオロプロパン

---

・インタビューフォーム（IV.2.(1)有効成分（活性成分）の含量及び添加剤） [2021年11月改訂（第10版）]

・添付文書（2項、3.1項） [2021年11月改訂（第4版）]