

Question

発作時の重要な基本的注意は？



Answer

本剤（フルティフォーム[®]）は、発現した発作を速やかに軽減する薬剤ではありません。

このため、本剤使用中に急性の発作が発現した場合には、短時間作動型の吸入 β_2 刺激剤等の他の適切な薬剤を使用するように患者に注意を与えてください。

また、本剤の使用量が増加するなど効果が十分でなくなってきた場合には、喘息の管理が十分でないことが考えられますので、できるだけ早く医療機関を受診するように患者に注意を与えてください。そのような状態では患者の生命が脅かされる可能性がありますので、患者の症状に応じてステロイド療法の強化（本剤のより高用量製剤への変更等）を考慮してください。

なお、感染を伴う喘息症状の増悪がみられた場合には、ステロイド療法の強化と感染症の治療を考慮してください。

添付文書の発作に関する重要な基本的注意の記載は、以下のとおりです。

8. 重要な基本的注意

- 8.1 本剤は既に起きている気管支喘息の発作を速やかに軽減する薬剤ではないので、毎日規則正しく使用すること。
- 8.3 本剤の投与期間中に発現する急性の発作に対しては、短時間作動型吸入 β_2 刺激剤等の他の適切な薬剤を使用するよう患者に注意を与えること。また、その薬剤の使用量が増加したり、あるいは効果が十分でなくなってきた場合には、喘息の管理が十分でないことが考えられるので、可及的速やかに医療機関を受診し医師の治療を求めるよう患者に注意を与えること。そのような状態では患者の生命が脅かされる可能性があるため、患者の症状に応じてステロイド療法の強化（本剤のより高用量製剤への変更等）を考慮すること。
- 8.4 感染を伴う喘息症状の増悪がみられた場合には、ステロイド療法の強化と感染症の治療を考慮すること。

・添付文書（8.1 項、8.3 項、8.4 項） [2021 年 11 月改訂（第 4 版）]