

## Question



使用開始時に空噴霧は必要ですか？ その回数はいくつですか？

## Answer

本剤（フルティフォーム<sup>®</sup>）の吸入時に適切な量の薬剤を噴霧させるために、初めて使用する前に空噴霧を行う必要があります。また、空噴霧の回数は「4回」です。

初めて使用する前には空噴霧を4回行ってから吸入するように指導してください。

なお、空噴霧中にも薬剤は出ていますので、吸入口を体から離して空噴霧を行うように指導してください。

添付文書の薬剤交付時の注意、吸入前の記載は、以下のとおりです。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

##### 14.1.1 吸入前

- (1) 本剤の投与にあたって、吸入器の操作法、吸入法等を十分に説明すること。
- (2) エアゾール剤の噴霧と吸入の同調が難しいと考えられる患者にはスパーサー（吸入用補助器）を使用させることが望ましい。

### 【解説】

初めて噴霧する時は、規定の1回噴霧量の有効成分が噴霧されていないが、4回空噴霧を行うことで、規定の1回噴霧量が噴霧されるようになっている。

- ・患者用説明文書（フルティフォーム<sup>®</sup>を使用される患者の皆様へ）
- ・インタビューフォーム（Ⅷ.11.適用上の注意）【2021年11月改訂（第10版）】
- ・添付文書（14.1.1項）【2021年11月改訂（第4版）】