

## Question



吸入後、うがいは必要ですか？

## Answer

口腔カンジダ症や嚔声（しゃがれ声）の副作用を予防するため、本剤（フルティフォーム<sup>®</sup>）の吸入後には“うがい”をするように指導してください。うがいが困難な方には口腔内をすすぐように指導してください。

添付文書の薬剤交付時の注意、吸入後の記載は、以下のとおりです。

### 14. 適用上の注意

#### 14.1 薬剤交付時の注意

##### 14.1.3 吸入後

口腔カンジダ症又は嚔声の予防のため、本剤吸入後に、うがいを実施するよう患者を指導すること。ただし、うがいが困難な患者には、うがいではなく口腔内をすすぐよう指導すること。

### 〈解説〉

本剤（フルティフォーム<sup>®</sup>）には、ステロイド剤（フルチカゾンプロピオン酸エステル）が含まれており、その吸入によって口腔カンジダ症や嚔声といった副作用が発現することがあるため、これらを予防するためにうがいの実施が重要となる。

### 臨床試験での嚔声の発現率

本剤の承認までの成人喘息患者を対象とした国内臨床試験における嚔声（発声障害）の発現率は5.3%（25/472例）であった。また、承認までの小児喘息患者を対象とした国内臨床試験（134例）においては、嚔声（発声障害）は認められなかった。

- 
- ・患者用説明文書（フルティフォーム<sup>®</sup>を使用される患者の皆様へ）
  - ・添付文書（14.1.3項）〔2021年11月改訂（第4版）〕
  - ・患者向医薬品ガイド〔2020年6月更新〕
  - ・インタビューフォーム（Ⅷ.8.(2)その他の副作用）〔2021年11月改訂（第10版）〕