

**【質問】ラスビック錠と牛乳、乳製品との併用は？**

**【回答】**

牛乳などの乳製品との併用投与に関する情報はありません。

ラスビック錠 75mg を服用する際には、コップ1杯程度の水またはぬるま湯で飲んでください<sup>1)</sup>。

**[解説]**

添付文書において、「ラスクフロキサシンとアルミニウム、マグネシウム、カルシウム、鉄、亜鉛を含有する製剤と併用経口投与時に、これらの金属イオンを含む薬剤と難溶性のキレートを形成し、本剤の吸収が阻害され、効果が減弱されるおそれがあるため、本剤と同時に服用させないこと」とされています<sup>2)</sup>。

**臨床薬理試験(制酸剤との併用)**

健康成人男性 9 例に乾燥水酸化アルミニウムゲル(1075.2mg)・水酸化マグネシウム(960mg)の配合剤とラスクフロキサシン(錠) 75mg を経口併用投与したとき、ラスクフロキサシンの  $C_{max}$  及び  $AUC_{last}$  はそれぞれ 0.513 倍[幾何平均比の 90%信頼区間(以下同様):0.446-0.591] 及び 0.681 倍[0.627-0.739]に減少しました<sup>2, 3)</sup>。

**出典:**

- 1) 患者向医薬品ガイド
- 2) 添付文書
- 3) 申請資料概要