

**【質問】**ペンタサ経口製剤の重大な副作用は？

**【回答】**

重大な副作用として、下記の疾患や症状等が報告されていますので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行ってください。

●間質性肺疾患(頻度不明)

間質性肺疾患(好酸球性肺炎、肺肺炎、肺臓炎、間質性肺炎等)が報告されているので、発熱、咳、呼吸困難、胸部X線異常等があらわれた場合には、投与を中止し適切な処置を行ってください。

●心筋炎(0.1%未満)、心膜炎(頻度不明)、胸膜炎(頻度不明)

胸水、胸部痛、心電図異常等があらわれた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行ってください。

●間質性腎炎、ネフローゼ症候群、腎機能低下、急性腎障害(いずれも頻度不明)

●再生不良性貧血、汎血球減少、無顆粒球症(いずれも頻度不明)、血小板減少症(0.1%未満)

●肝炎(0.1%未満)、肝機能障害(頻度不明)、黄疸(0.1%未満)

肝炎、AST、ALT、 $\gamma$ -GTPの上昇等を伴う肝機能障害、黄疸があらわれることがあります。

●睥炎(0.1%未満)

出典：添付文書