

**【質問】**ペンタサ注腸はアルミ袋を開封したらすぐに使用すべきですか？

**【回答】**

ペンタサ注腸は、アルミ袋から取り出して保管すると、着色と類縁物質の増加などの変化が認められています。

このため、上澄液が無色～微黄色の範囲を超えて着色したものは使用しないでください。

アルミ袋を開封した場合は、すぐに取り出して使用してください。また、使用直前までアルミ袋から取り出さないようにしてください。

**14.適用上の注意**

**14.1 薬剤交付時の注意**

14.1.1 本剤はポリエチレン製の容器に入った液剤で、窒素充填したアルミの袋に入っている。使用直前に袋から取り出して使用するよう患者に指導すること。

14.1.3 メサラジンは光及び酸素の影響で分解されやすいため、アルミ袋を開封したものは保存できない。

14.1.4 本品は白色～微黄色の懸濁液である。メサラジンは酸化により分解されやすく有色の分解物を生成するため、上澄液が無色～微黄色の範囲を超えて着色したものは使用しないこと。

**20.取扱い上の注意**

アルミ袋開封後は、速やかに使用すること。

無包装の場合、光(120万 lx・hr)により、着色、pHの低下および類縁物質の増加といった変化が起こります。

出典：添付文書、インタビューフォーム