

【質問】ジムソ膀胱内注入液の投与回数はいくつですか？

【回答】

投与回数は6回で、投与間隔は2週間となります。

なお、既存の情報^{1)~4)}から、投与回数を6回より増やしても有効性に上乗せがないことが想定されています。このため、2週間間隔で6回膀胱内投与により症状の改善が認められない場合は、他の適切な治療を行ってください⁵⁾。

添付文書

6.用法及び用量

通常、成人には50%(w/w)ジメチルスルホキシド溶液を1回あたり1バイアル50mL(ジメチルスルホキシドとして27g)、2週間間隔で6回膀胱内に注入する。なお、膀胱内注入後、可能な限り15分間以上膀胱内に保持してから排出させる。

出典:添付文書

1) Ek A, et al. :Scand J Urol Nephrol. 1978 ;12 :129-131 (PMID:358382)

2) Perez-Marrero R, et al. :J Urol. 1988 ;140 :36-39 (PMID:3288775)

3) Stewart BH, et al. :J Urol. 1976 ;116 :36-38 (PMID:933285)

4) Stewart BH, et al. :J Urol. 1972 ;107 :377-380 (PMID:5010705)

5) インタビューフォーム V.(2) 用法及び用量の設定経緯・根拠

審査報告書 1.3 用法・用量について