

添付文書改訂のお知らせ

89-2
平成元年2月

バクシダール[®]錠 100mg

製造元 杏林製薬株式会社

バクシダール[®]錠 200mg

販売元 杏林薬品株式会社

このたび弊社製品、**バクシダール錠100mg**及び同**200mg**につきまして、
『使用上の注意』に「相互作用」の項目を追加改訂いたしますので、ご案内
申し上げます。

	新	旧
使 用 上 の 注 意	(1) 次の患者には投与しないこと	(1) 次の患者には投与しないこと
	(2) 次の患者には慎重に投与すること	(2) 次の患者には慎重に投与すること
	(3) 副作用	(3) 副作用
	(4) 妊婦・授乳婦への投与	(4) 妊婦・授乳婦への投与
	(5) 小児への投与	(5) 小児への投与
	(6) 相互作用	
	1) <u>類似化合物(エノキサシン)で、フェンブフェンとの併用により、まれに痙れんがあらわれるとの報告があるので、併用は避けることが望ましい。</u>	
	2) <u>アルミニウム又はマグネシウム含有の制酸剤との併用により、吸収が低下し、効果が減弱されるおそれがあるので、併用は避けることが望ましい。</u>	
(7) 臨床検査値への影響	(6) 臨床検査値への影響	
(8) その他	(7) その他	

(一部：自主改訂箇所)