

# 添付文書改訂のお知らせ

92-8  
平成4年11月

**バクシダール<sup>®</sup>錠100mg・200mg**  
**小児用バクシダール<sup>®</sup>錠50mg**



杏林製薬株式会社  
東京都千代田区神田駿河台2-5

謹啓 平素は格別の御引立てを賜わり厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社のバクシダール錠100mg・200mg及び小児用バクシダール錠50mgについて、行政指導に基づき、「使用上の注意」を改訂致しますので、ご案内申し上げます。

敬白

	新	旧
使用上の注意	(3) 副作用 9) その他 ①他のニューキノロン系抗菌剤でまれに低血糖があらわれる（高齢者特に腎障害患者であらわれやすい）との報告があるので、慎重に投与すること。 ②まれに全身倦怠感、冷感、熱感、浮腫、心悸亢進、胸痛があらわれることがある。	(3) 副作用 9) その他  まれに全身倦怠感、冷感、熱感、浮腫、心悸亢進、胸痛があらわれることがある。
	(7) 相互作用 1) 2) ニューキノロン系抗菌剤でテオフィリンとの併用により、テオフィリンの血中濃度を上昇させ、その作用を増強させるとの報告があるので、併用する場合には、テオフィリンを減量するなど慎重に投与すること。	(7) 相互作用 1)  2) アルミニウム又はマグネシウム含有の制酸剤、鉄剤との併用により、本剤の吸収が低下し、効果が減弱されるおそれがあるので、併用は避けることが望ましい。
	3) アルミニウム又はマグネシウム含有の制酸剤、鉄剤との併用により、本剤の吸収が低下し、効果が減弱されるおそれがあるので、併用は避けることが望ましい。	2) アルミニウム又はマグネシウム含有の制酸剤、鉄剤との併用により、本剤の吸収が低下し、効果が減弱されるおそれがあるので、併用は避けることが望ましい。

—：平成4年10月1日付事務連絡による改訂