

—— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 ——

再評価結果のお知らせ

「用法及び用量」の改訂

利尿・降圧剤

平成10年4月

ベハイド® ベハイド®(100倍散



杏林製薬株式会社

東京都千代田区神田駿河台2-5

(ベンチルヒドロクロロチアジド錠・散)

謹啓 平素は格別の御引立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度医療用医薬品の再評価結果が公示されたことに伴い、弊社 **ベハイド®**・**ベハイド®(100倍散** の添付文書について「用法及び用量」を改訂致しましたので、ご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、改訂内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

敬白

改訂内容

《用法及び用量》

改 訂 後	改 訂 前
<p>通常、成人にはベンチルヒドロクロロチアジドとして、1回4～8mg（錠；1～2錠、100倍散；0.4～0.8g）を1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。</p> <p>維持量として、1週2～3回間歇投与する。</p> <p>ただし、<u>高血圧症に用いる場合には少量から投与を開始して徐々に増量すること。また、悪性高血圧に用いる場合には、通常、他の降圧剤と併用すること。</u></p>	<p>通常、成人にはベンチルヒドロクロロチアジドとして1回4～8mg（錠；1～2錠、100倍散；0.4～0.8g）を1日2回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。</p> <p>維持量として、1週2～3回間歇投与する。</p> <p>ただし、悪性高血圧に用いる場合には、通常、他の降圧剤と併用すること。</p>

——：医薬発第215号(平成10年3月12日付)に基づく改訂箇所