

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

消化管運動調律剤

ネプテン錠

NEPTEN Tablets

(マレイン酸トリメブチン錠)

使用上の注意改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、弊社マレイン酸トリメブチン製剤「ネプテン錠」に関し、使用上の注意を下記のとおり自主改訂することと致しましたのでお知らせ申し上げます。

今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

2002年5月

謹白

【使用上の注意】改訂内容

【副作用】の項を以下のように改める。(アンダーライン部分を追記)

改 訂 後		改 訂 前	
<p>1. 副作用</p> <p>本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p>		<p>1. 副作用</p> <p>本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>副作用が認められた場合には、投与を中止するなど適切な処置を行うこと。</p>	
	頻度不明		頻度不明
1) 消化器	便秘、下痢、腹鳴、口渇、口内しびれ感、悪心・嘔吐等	1) 消化器	便秘、下痢、腹鳴、口渇、口内しびれ感、悪心・嘔吐等
2) 循環器	心悸亢進	2) 循環器	心悸亢進
3) 精神神経系	眠気、めまい、倦怠感、頭痛等	3) 精神神経系	眠気、めまい、倦怠感、頭痛等
4) 肝 臓	AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇等	4) 肝 臓	AST(GOT)、ALT(GPT)の上昇等
5) 過敏症	発疹、蕁麻疹、瘙癢感等	5) 過敏症	発疹、蕁麻疹、瘙癢感等
6) 泌尿器	排尿障害、尿閉		

製造元  **大冨七医薬品株式会社**
 大阪市西区新町一丁目1番17号

販売元  **杏林製薬株式会社**
 東京都千代田区神田駿河台2-5