

薬には病気を治したり、症状をやわらげたりする効果がある一方、副作用があらわれることがあります。医師に指示された用法・用量にしたがって使用してください。体調が良くなったと自分で判断し、使用することをやめたり、量を加減したりすると、病気が悪化することがあります。

薬のことでわからないこと、心配なことなどがありましたら、医師や薬剤師に相談してください。

デザレックス錠 5mg

一般名： デスロラタジン (Desloratadine)	販売名	デザレックス錠 5mg	
	形状（製剤写真等）		

1. どんな薬

- この薬は、アレルギー症状や炎症をしずめる働きがあり、アレルギー性鼻炎、じんましん、皮膚疾患（湿疹、皮膚炎、皮膚そう痒症）に伴うかゆみの治療に用いられます。

2. この薬を使用できない人、特に注意して使用する必要がある人

- 次の人はこの薬を使用できません。必ず医師や薬剤師に相談してください。
過去にデザレックス錠に含まれる成分又はロラタジンで過敏症のあった人
- 次の人は特に注意が必要です。使い始める前に医師や薬剤師に相談してください。
 - ・過去にてんかんがあった人
 - ・腎臓に重い障害のある人
 - ・肝臓に重い障害のある人
 - ・妊婦または妊娠している可能性のある人
 - ・授乳中の人
- この薬には一緒に使用する場合に注意が必要な薬があります。他の薬を使用している場合や、新たに使用する場合は、必ず医師や薬剤師に相談してください。

3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと

- この薬の使用により、以下のような症状があらわれることがあります。これらの症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用など
顔や手足の筋肉がピクピク動く、しばらくの間、頭がはっきりせずぼんやりする、ぼんやりしてまわりのことがよく分からなくなる、手足の筋肉がこわばってガクガクとふるえる	てんかん（過去にてんかんのあった人）

- 効果が認められない場合は、医師に相談してください。

4. ほかに知られている副作用

「3. この薬を使うにあたり注意すべき副作用・注意すべきこと」に記載されている副作用のほか、比較적으로よくみられる副作用の一例は以下のとおりです。これら以外の副作用もあらわれることがあります。これらの症状や、普段と異なる症状に気づいたら、医師や薬剤師に相談してください。

主な症状	考えられる副作用
冷汗が出る、めまい、顔色が青白くなる、手足が冷たくなる、意識がなくなる、体じゅうがかゆい、皮ふにブツブツができる、のどがかゆい、ふらつき、ドキドキする、息がしにくいと感じる	ショック、アナフィラキシー
顔や手足の筋肉がピクピク動く、しばらくの間、頭がはっきりせずぼんやりする、ぼんやりしてまわりのことがよく分からなくなる、手足の筋肉がこわばっ	けいれん 痙攣

てガクガクとふるえる	
疲れやすい、体が重くて動きたくない感じがする、力が入らない、吐き気、食欲がない、目の白い部分が黄色っぽくなる、皮ふが黄色くなる、尿の色が濃くなる、体がかゆくなる	肝機能障害、黄疸

5. 保管方法

光と湿気をさけて室温（1～30℃）で保管してください。

6. 問い合わせ先

症状、使用方法、副作用などについて不明な点がある場合は、医師や薬剤師におたずねください。

この製品に対する一般的な事項に関する質問は下記へお問い合わせください。

製造販売業者：オルガノン株式会社、URL <https://www.organon.com/japan/>

販売会社：杏林製薬株式会社 (<https://www.kyorin-pharm.co.jp/>)、

くすり情報センター

電話：フリーダイヤル 0120-409-341

受付時間：9時～17時30分（土・日・祝日・会社休日を除く）

※医薬品副作用被害救済制度：お薬は正しく使っていても、副作用が起こることがあります。もしも副作用で重い健康被害が生じた場合に、医療費や年金などの給付が受けられる公的な制度です。

制度の詳細はこちらをご覧ください。

https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

なお、抗がん剤、免疫抑制剤や抗ウイルス薬などにはこの制度の対象にならないものがあります。対象外となる医薬品はこちらから検索いただけます。

<https://www.pmda.go.jp/relief-services/adr-sufferers/0022.html>