

ムコダイン錠 250 mg、錠 500 mg、細粒 50%、DS33.3%、DS50%、シロップ 5%

項目別副作用発現頻度及び臨床検査値異常一覧

総症例数	11,066 例
副作用発現例数	101 例 (0.91%)

副作用の種類		発現件数	発現率(%)
皮膚付属器 官 障 害	紅斑性発疹	1	0.01
	湿疹	5	0.05
	蕁麻疹	1	0.01
	そう痒	5	0.05
	発疹	11	0.10
胃腸系障害	胃腸障害	1	0.01
	嘔気	7	0.06
	嘔吐	5	0.05
	下痢	19	0.17
	口渇	6	0.05
	食欲不振	27	0.24
	腹痛	15	0.14
	鼓腸放屁	2	0.02
	舌苔	1	0.01
呼吸器系障害	咳の増悪	1	0.01
	鼻漏亢進	1	0.01
	鼻出血	1	0.01
そ の 他	動悸	1	0.01
	傾眠	1	0.01
	頭痛	2	0.02
	全身の圧迫感	1	0.01

臨床検査値の異常変動は総ビリルビン上昇 2 件、ALT(GPT)の上昇、好中球増加、リンパ球減少各 1 件が認められた。

(ムコダイン錠 250mg、錠 500mg、細粒 50%、K10、シロップ 2%・5%、DS33.3%・50%の承認時のデータ及び使用成績調査を含む)